


ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d'un échantillon national tiré au sort de 1500 pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d'évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l'évolution dans le temps de ces données.

RÉSULTATS 2020

En 2020, 122 pharmacies ont participé à l'enquête (taux de participation : 8,2 %) et 402 malades ont été inclus.



Nombre de malades par pharmacie par semaine (2004-2020)


PRESCRIPTEURS

Les médecins libéraux représentaient 80 % des prescripteurs, les hospitaliers 19,8 %, les CSAPA 0,2 %. Dans 80,1 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans 19,9 % des cas, un autre spécialiste (oncologue : 5,2 %, chirurgien 2,7 %, pneumologue et anesthésiste-réanimation : 1,2 %, rhumatologue et soins palliatifs : 1 %, autres : 6 %).

MÉDICAMENTS

Les médicaments les plus prescrits sont :
- par DCI : morphine (38,1%) oxycodone (34,5%), et fentanyl (26,9%).
- par spécialité : Skenan® (18,2 %), Oxynorm(oro)® (17,5 %), Oxycontin® (16,9 %), Actiskéan® (15,7 %) et Durogesic® (13,1 %). Il s'agissait d'un nouveau traitement dans 23% des cas, d'un traitement de plus d'un an dans 31,1 % des cas.

PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS PAR INDICATION




Conformité des ordonnances	%
ordonnance sécurisée	96,3
posologie en lettres	92,5
carré de sécurité rempli	92,2
espace étroit dernière ligne/signature	71,4

CARACTÉRISTIQUES DES MALADES

L'âge moyen était de 65,6 ans (médiane : 67 ; extrêmes : 16 -98 ans) ; 33,6 % avaient 75 ans ou plus. Il y avait 58,3 % de femmes et 41,7 % d'hommes.

INDICATIONS

Dans 61,9 % des cas, il s'agissait d'une douleur chronique et dans 17,9 % des cas, d'une douleur aiguë (dans 1,9 % des cas, les deux).



Evolution des indications, 2004-2020

CONCLUSION

En 2020, la morphine est le médicament le plus prescrit devant l'oxycodone puis le fentanyl, avec un nombre de malades en hausse. Elle est majoritairement prescrite dans les indications rhumatologiques et "autres". La baisse des prescriptions de fentanyl transdermique se poursuit et les prescriptions d'oxycodone se stabilisent mais sont majoritaires en cancérologie. Les prescriptions de fentanyl transmuqueux sont stables, mais il y a toujours une forte proportion de prescriptions hors AMM. Ses indications « autres » sont, pour la première fois, majoritaires devant les indications cancérologiques. Toutes molécules confondues :
- Les indications rhumatologiques et cancérologiques sont majoritaires (avec une légère hausse en rhumatologie),
- Les indications neurologiques continuent de diminuer,
- Les indications « autres » se stabilisent, la morphine étant la principale molécule prescrite.